



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

## AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°12 du 13 Août 1998 - 2 pages

# Grandes Cultures

## MAÏS

Stades : brunissement des soies à grains formés, aqueux-laiteux.

## Pyrale

Poursuite du vol dans la Châtaigneraie (15). Captures très limitées après le 20/07 sur le réseau du Puy-de-Dôme et de l' Allier.

### Bilan piègeage pyrale.

Poste piègeage	Début de vol	"Pic" de vol	Captures du 10/07 au 16/07	Captures du 17/07 au 23/07	Captures du 24/07 au 30/07	Captures du 31/07 au 12/08	Cumul captures
La Ferté-Hautrive 03	29/06	03/07	5	3	0	3	23
Chamres 03	02/07	?	0	0	2	0	4
Franchesse 03	08/07	08/07 et 15/07	5	0	0	0	10
Chamysaire 03	22/06	03/07	2	0	0	0	28
Riom 63	22/06	03/07	0	1	0	0	14
St Babel 63	29/06	15/07	20	0	0	0	27
Lempdes 43	24/06	28/06 et 06/07	2	0	0	0	13
Romans St-mary 15	30/06	24/07	2	0	13	9	26

Le modèle climatique nous indique que nous avons atteint le «pic» de vol (somme de base 10 ° de 530 ° depuis le 01/01/98). dans la fourchette indiquée dans nos précédant bulletin.

Poste météo	530 °C atteint le :
La Ferté-Hautrive 03	06/07
Chamres 03	13/07
St-Pourçain/B 03	13/07
Lucy-Lévis 03	16/07
Montmarault 03	17/07
Aulnat 63	08/07
Maringes 63	10/07
Plauzat 63	16/07
Aurillac 15	26/07

## Pucerons

Les populations restent très toujours très faibles.

Nos conseils : pas d'intervention à envisager

## TOURNESOL

Stades : fin floraison à début maturation (M2).

## Phomopsis

Aucun symptôme et absence constante de risque.

## Maïs

### Pyrale :

Vol terminé.

### Pucerons :

Absence de risque

## Tournesol

### Phomopsis :

Absent

## Colza

Le desherbage

## Céréales

2 déliants à conserver (herbicides et insecticides)

Service Régional de la Protection des Végétaux  
Site de Marmilhat BP 45  
63370 LEMPDES  
Tél : 04.73.42.14.83  
Fax : 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de la DRAF AUVERGNE

Le Directeur-Gérant : J.F. CHAUVÉAU

Publication périodique  
C.P.P.A.P n° 2315AD  
ISSN n° 1254.6372

Tarifs courrier : 320 F  
Fax et courrier : 370 F

# COLZA

## Dés herbage

Rien de neuf au niveau des produits encore cette année, mais le dés herbage reste un des éléments principaux pour une bonne implantation du colza et mauvaise implantation rime souvent avec mauvaise campagne. De plus, le dés herbage du colza peut jouer un rôle essentiel pour éliminer certaines adventices posant problème dans d'autres cultures de la rotation ; ex. : brome. Dès la récolte du précédent, réaliser un faux semis pour faire lever un maximum d'adventices.

Quelques connaissances de base sont nécessaires pour réaliser un bon dés herbage :

- connaître la flore de la parcelle,
- adapter le dés herbage à la parcelle ou à la partie de parcelle, voire à la bordure, en fonction de la flore potentielle (4 ou 5 mauvaises herbes les plus fréquentes).

Réaliser une implantation rapide du colza. Une culture bien implantée grâce à une levée rapide évite une infestation et un développement des adventices. En effet, le colza peut rapidement "étouffer" les mauvaises herbes et les rendre moins concurrentielles.

Le dés herbage du colza doit être envisagé dès l'implantation en pré-levée ou post-levée précoce. Nous ne disposons pas actuellement de suffisamment de produit de post-levée pour contrôler toutes les mauvaises herbes de façon acceptable.

Un traitement de pré-semis est quasi-obligatoire sur beaucoup de situations.

Les deux produits suivants peuvent être utilisés :

- **trifluraline** (Tréflan, Brassix,...) sert de traitement de base dans de nombreuses parcelles et permet de dés herber les dicotylédones classiques (véroniques, coquelicots, stellaires, alchemilles, gaillets, vulpins,...).
- **napropamide** (Dévrinol, Colzamide,...) se justifie dans les parcelles à forte infestation de géraniums ou de matricaires.

Ces deux produits seuls ou associés sont rarement suffisants et se retrouvent dans un programme.

Les produits de post-semis peuvent être utilisés seuls. Néanmoins un programme avec un produit de pré-semis est souvent plus adapté à la parcelle.

- **Butisan S** en pré-levée à 1,5 l/ha peut présenter quelques problèmes de sélectivité sur sol battant ou filtrant. Un fractionnement pré-levée + post-levée précoce, au stade 1ère feuille pointante, peut être effectué (cas de Butisan S et de Novall).

- **Novall à 2,5 l/ha** en pré-levée et post-levée précoce, produit à base de métazachlore et de quinmerac. Cette dernière matière active le renforce sur gaillet et euphorbe par rapport au Butisan S.

- **Colzor à 6 l/ha** ou 5 l/ha en sol sableux présente une bonne efficacité sur capselle, gaillet, passeraie et sisymbre. Il reste nettement insuffisant sur coquelicot et nécessitera un programme avec du Tréflan pour cette adventice. Ce produit, très influencé par les conditions d'humidité au moment de l'application, sera positionné le plus près possible du semis.

Des programmes à trois produits (Tréflan ou Dévrinol + Colzor + Butisan) peuvent être nécessaires sur certaines parcelles très sales avec présence de passeraie.

Ces programmes peuvent aussi se limiter à la bordure afin d'éviter la colonisation de toute la parcelle par ces adventices.

Tous ces produits de pré-levée, post-levée précoce ont une action graminicide sur vulpins et paturins.

Il reste des crucifères indestructibles dans le colza (calépine, caméline,...). Aucun herbicide, actuellement homologué sur colza, ne permet de détruire cette flore qu'il faudra prendre en compte au moment du dés herbage des autres cultures, de la rotation, tout comme les herbicides du colza détruisant certaines adventices difficiles à détruire dans le blé.

Si des vulpins résistants aux anti-graminées à absorption foliaire (type fol ou dime) sont apparus dans la culture du blé, les dés herbants de pré-levée efficaces sur graminées permettront une destruction partielle de ces adventices.

Les traitements de rattrapage, essentiellement anti-graminées, seront à envisager en fonction des adventices présentes dans la parcelle au début de l'automne et feront l'objet d'une communication ultérieure.

**Quelques exemples de programme de dés herbage du colza (à coût raisonnable).**

Pré-semis	Pré-levée Post-semis précoce	Commentaires
Tréflan - 2,5 l	Butisan - 1,5 l ou fractionné	Bon rapport qualité-prix
Tréflan - 2,5 l	Novall - 1,8 l	Bonne efficacité globale. Utiliser 1,8 à 2 l pour obtenir une bonne efficacité en cas de forte infestation de capselle
Tréflan - 2,5 l	Colzor - 6 l	Plus efficace sur gaillet, coquelicot. La dose de Colzor ne doit pas être inférieure à 5 l, sinon l'efficacité sur capselles, passeraie et repousse de céréales sera insuffisante
Tréflan - 2,5 l + Dévrinol - 2,2 l		Envisageable en absence de capselle et présence de matricaire et géranium
Dévrinol - 2,2 l	Butisan - 1,5 l	Bonne efficacité sur capselle et géranium

# CEREALES

2 dépliants verts ITCF à conserver.

- Herbicides campagne 1998-1999.

- Insecticides, traitement des semences et régulateurs de croissance campagne 1998-1999.